



## HÍGÍTÁSI KISOKOS



A NÁTRIUM-HIPOKLORIT TARTALMÚ, VIRUCID  
HATÁSÚ FELÜLETFERTŐTLENÍTŐ HÍGÍTÁSA\*

A fertőtlenítőszer Na-hipoklórít tartalma	Munkaoldat elkészítése	
	Fertőtlenítőszer	Víz
15%	10 ml	1 literre
	100 ml	10 literre
9-12%	20 ml	1 literre
	200 ml	10 literre
4-5%	30 ml	1 literre
	300 ml	10 literre
1,5%	100 ml	1 literre
	1000 ml	10 literre

\*Amennyiben címke eltérő utasítást nem tartalmaz

## FELÜLETFERTŐTLENÍTÉS

### 1. Mosható felületek

Padló, fal és más mosható felületek fertőtlenítése:  
2 % -os Natriumhipoklorit 90  
Háztartási hypo

Oldat készítése:

2 dl Natriumhipoklorit 90 + 9,8 l víz  
6 dl Háztartási Hypo + 9,4 l víz

10 liter fertőtlenítő oldat 50 – 60 m<sup>2</sup> felület fertőtlenítésére alkalmas.

### 2. Nem mosható felületek (kárpit, szőnyeg)

Neomagnol tablettával:

1 liter víz + 20 tableta, az oldattal a textíliát alaposan át kell kefélni (Vigyázat színváltozást okozhat!)

Dezinficiens habbal:

Liquor formaldehydi saponatus (Lysoform) 10 % -os vizes oldatából habot képezünk. A habot a fertőtlenítendő felületre felvisszük, az anyagba bedörzsöljük.

Száradás után porszívózás, kefézés.

Fertőtlenítés összefoglaló táblázata

Fertőtlenítendő anyag megnevezése	A választható fertőtlenítési módszer megnevezése	A fertőtlenítőszer		A fertőtlenítő anyag egysége/mennyisége	Átlagosan szükséges mennyiség
		megnevezése	töménysége %		
Ásott kút	elegyítés	Na-hypoklorit 90 Háztartási hypo	töményen	1 m <sup>3</sup> / 1 dl. 1 m <sup>3</sup> / 3 dl.	4m <sup>3</sup> 4dl 4m <sup>3</sup> 1,2 l
Arnyékszék űrtartalom felülete	beszórás	klórmész	töményen	1m <sup>2</sup> / 1 kg	1m <sup>2</sup> /1kg
széklet	elegyítés	klórmész mésztej	10%	300 l/m <sup>3</sup>	2m <sup>3</sup> /600l
	beszórás beszórás	klórmészpor égetett mészpor	töményen töményen	37,5 kg/m <sup>3</sup>	2m <sup>3</sup> /750kg/m <sup>3</sup> 2 m <sup>3</sup> /75kg
fal padozat	meszelés	klórmész mésztej	10% 20%	1-1,5 l/m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup> /10-15 l
Szennyvíz	elegyítés	klórmész Na-hypoklorit 90	töményen töményen	150g/m <sup>3</sup> 5l/m <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup> /1,5 kg 10 m <sup>3</sup> /50 l
Trágyalé	elegyítés	klórmészpor	töményen	2kg/m <sup>3</sup>	
Talaj, Szemétdomb, Trágyadomb	elegyítés	klórmész mésztej	10% 20%	5 l/m <sup>2</sup>	
	beszórás	klórmészpor égetett mészpor	töményen töményen	1 kg/m <sup>2</sup>	
Felület	le mosás	Na-hypoklorit 90 Neomagnol Háztartási hypo	2%	2 dl+9,8dl víz 200 g+9,8l víz 6dl+9,4 l víz	
Higiénés kézfertőtlenítés	oldat	Neomagnol tabl. + Ételecet	0,20%	2tabl/1+ ételecet 1 evőkanál	6 tbl/3 l víz + ételecet 3 evőkanál

## Kézfertőtlenítés

A kézfertőtlenítést, alkoholtartalmú kézfertőtlenítő folyadékkal, kendővel, vagy kézfertőtlenítő géllal lehet végezni, úgy hogy a kézfertőtlenítő szert a kezeken egyenletesen kell eloszlatni a csomagoláson megadott behatási ideig.

A kézfertőtlenítésre alkalmas készítmények a nagyobb drogériákban, vagy a gyógyszertárakban beszerezhetőek.

Neomagnol tabletta 0,2 %-os oldata is alkalmazható

### Neomagnol oldat készítése:

1 liter vízhez 2 db Neomagnol tabletta szükséges + 1 evőkanál ételecet

Kézfertőtlenítés ideje: 1 perc

A frissen készített oldat legalább 4 óránként cserélendő!

# **FELHÍVÁS A LAKOSSÁGHOZ**

## **AZ ÁRVÍZZEL VESZÉLYEZTETETT TELEPÜLÉSEKEN**

**A fertőzések és járványos megbetegedések elkerülése végett:**

- 1. Csak ellenőrzött, vezetékes ivóvizet igyanak!**
- 2. Ásott kutak vizét tilos ivóvízként használni**
- 3. A saláta és zöldségfélét csak alapos mosás és főzés után fogyasszák!**
- 4. Alaposan átfőzött illetve sütött ételeket, vagy konzerveket egyenek!**
- 5. Hasmenéses panaszok esetén AZONNAL forduljanak házi orvosukhoz!**
- 6. Az esetleges kitelepítésre felkészülve SÜRGŐSSÉGI CSOMAGOT állítsanak össze maguknak, melyben legyen:**
  - egy váltás ruha,
  - tisztálkodási szerek,
  - állandóan szedett gyógyszerek,
  - csecsemőknek tápszer, ruházat, pelenka!